

SYGDOM	INKUBATIONSTID	SMITTER FRA	SMITTER TIL	MØDE I INSTITUTION	SÆRLIGE FORHOLD
BYLDER	Få dage	Bylden begynder at væske	Såret er tørret ind	Når betændelsesstedet er tørret ind	
BØRNEORM	2-6 uger	2 uger efter smitte	Behandling iværksat	Ingen begrænsninger	
BØRNESÅR	1-3 døgn	Sårene begynder at væske	Sårene er tørret ind og skorperne faldet af	Når sårene er ophelede, dvs. tørre, og skorperne er faldet	Skolebørn må møde, hvis sårene ikke er meget udbredte, se side 19
CYTOMEGALOVIRUSINFEKTION	3-12 uger	Se side 20	Se side 20	Ingen begrænsninger	
FNAT	3-6 uger	Kort efter smittetidspunkt	Behandling iværksat	Når behandling er iværksat	
FORKØLELSE OG VIRUSHALS-BETÆNDELSE	1-7 dage	1 døgn inden udbrud	5 døgn efter udbrud	Når barnet er rask, og der ikke er pasningsproblemer	
FORKØLELSSESÅR (<i>herpes</i>)	2-12 dage	Dannelse af blærer	Blærerne er tørret ind	Ingen begrænsninger	Hyppigst smitte fra raske smittebærere
FÅRESYGE	2-3 uger	5 dage efter at barnet er smittet, eller 7 dage inden symptomerne er begyndt	Indtil kirtelhævelsen er på retur	Når barnet er rask, og kirtelhævelsen er på retur	
HAND, FOOT AND MOUTH DISEASE	3-8 dage	Udbrud af sygdommen	Udbrud er på retur	Når barnet er rask	
HEPATITIS A (<i>smitsom leverbetændelse</i>)	2-6 uger	Sidste del af inkubationstiden	Få dage efter sygdomsudbrud	Når barnet er rask	Smitte fra børn uden symptomer forekommer
HEPATITIS B (<i>serumhepatitis</i>)	1-6 mdr.	Se side 26	Se side 26	Når barnet er rask	

SYGDOM	INKUBATIONSTID	SMITTER FRA	SMITTER TIL	MØDE I INSTITUTION	SÆRLIGE FORHOLD
INFLUENZA	1-5 dage	1 døgn inden udbrud	Barnet er rask	Når barnet er rask	
KIGHOSTE	7-10 dage	7-10 dage efter barnet er smittet, eller fra forkølelssymptomerne er begyndt	6 uger efter de typiske hosteanfald er begyndt	Når hosteanfald ikke giver anledning til pasningsproblemer	Særlige regler for uvaccinerede børn under 1 år, se side 29
KYSSESYGGE (<i>mononucleose</i>)	4-6 uger	Udbrud af sygdommen	Barnet er rask	Når barnet er rask	Kun lidt smitsomt, smitte fra raske smittebærere
LUS	2-8 uger	Smittetidspunkt	Behandling iværksat	Når behandling er iværksat	
LUSSINGESYGGE (<i>parvovirusinfektion, erythema infectiosum</i>)	1-2 uger	Få dage før udslættets udbrud	Udslættet er brudt ud	Når barnet er rask	
MAVE- INFEKTION MED DIARRÉ	Oftest et par dage	Diarréens udbrud	Afføringen er normaliseret	Når barnet er rask, og afføringen er normal	Smitte fra raske smittebærere forekommer
MELLEMØREBE- TÆNDELSE MED ØREFLÅD	Komplikation til luftvejsinfektion	Kun i sjældnere tilfælde indeholder flåddet bakterier, der kan smitte andre		Afhænger af eventuel smitterisiko og pasningsproblemer	Se side 34
MENINGOKOK- SYGDOM (<i>smitsom meningitis</i>)	2-8 dage	Kort før sygdomsudbrud	Behandling iværksat	Når behandlingen er afsluttet, og barnet er rask	Hyppigst smitte fra raske smittebærere
MÆSLINGER	8-11 dage	7 dage efter barnet er smittet, eller fra forkølelssymptomerne er begyndt	Indtil 5 dage efter udbrud af udslæt	Når barnet er rask	

SYGDOM	INKUBATIONSTID	SMITTER FRA	SMITTER TIL	MØDE I INSTITUTION	SÆRLIGE FORHOLD
SKARLAGENSEFEBER OG BAKTERIEL HALSBETÆNDELSE	1-3 døgn	Barnet er smittet	Der er givet penicillin i 2 dage	Efter 2 dages penicillinbehandling, såfremt barnet er rask	Smitte fra raske smittebærere forekommer
SKOLDKOPPER	2-3 uger	7 dage efter udsættelse, eller 3 døgn før udslættets frembrud	5 dage efter udslættets frembrud, eller indtil der ikke er fremkommet nye blærer i 2 dage, og blærene er tørret ind	Når barnet er rask og smittefrit	
SKOVFLÅTOVERFØRT BORRELLIA-INFEKTION	3-30 dage	Kun smitte ved bid af skovflåt		Når barnet er rask	Ikke smitte mellem mennesker
SVAMPEINFEKTIONER	Uger	Udbrud af udslæt	Behandling iværksat	Ingen begrænsninger	Kun lidt smitsomt, smitte fra raske smittebærere
TREDJEDAGSUDSLÆT (<i>exanthema subitum</i>)	1-2 uger	Ukendt	Ukendt	Når barnet er rask	
VANDVORTER (<i>mollusca</i>)	1 uge-6 mdr.	Udbrud	Behandling iværksat	Ingen begrænsninger	
VORTER	2-3 mdr.	Udbrud	Behandling iværksat	Ingen begrænsninger. Fodvorter tilrådes dog til dækket eller behandlet lokalt	Hyppig smitte fra raske smittebærere
ØJENBETÆNDELSE	1-3 døgn	Øjenbetændelse kan i nogle tilfælde smitte i perioden med pusflåd		Når der kun er lidt pusflåd, og barnet er rask uden pasningsproblemer, se side 45	Se side 44